



# Az $R^3$ tér geometriája

---

*Összeállította: dr. Leitold Adrien  
egyetemi docens*

# Vektorok


- **Vektor:** irányított szakasz

Jel.:  $\underline{a}$  ,  $\mathbf{a}$  ,  $\vec{a}$  ,  $\overrightarrow{AB}$  ,

Jellemzői:


- irány,
  - hosszúság, (abszolút érték) jel.:  $|\underline{a}|$
- 
- **Speciális vektorok:**
    - **nullvektor:** hossza 0, iránya tetszőleges. Jel.:  $\underline{0}$ ,  $\underline{o}$
    - **egységvektor:** hossza egységnyi.
- 
- **Megjegyzés:** az azonos hosszúságú és irányú, de különböző kezdőpontú vektorokat azonosaknak tekintjük.

# Két vektor szöge



- A vektorokat közös kezdőpontba tolva az általuk meghatározott félegyeneselek szöge Jel.:  $\angle (\underline{a}, \underline{b}) = \varphi$
- **Speciálisan:**
  - Ha  $\varphi = 0^\circ$ ,  $\Rightarrow$   $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  azonos irányú, (párhuzamos)
  - Ha  $\varphi = 180^\circ$ ,  $\Rightarrow$   $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  ellentétes irányú, (párhuzamos)
  - Ha  $\varphi = 90^\circ$ ,  $\Rightarrow$   $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  merőleges.

# Vektorok koordináta-rendszerben



A vektorokat **helyvektorok**-ként helyezük el a térbeli, derékszögű (Descartes-féle) koordináta-rendszerben.

Ekkor minden térbeli vektor egyértelműen felbontható a koordináta-tengelyek irányába eső összetevőkre:

$$\underline{v} = v_1 \cdot \underline{i} + v_2 \cdot \underline{j} + v_3 \cdot \underline{k}$$

## Vektorok koordináta-rendszerben (folyt.)

- A  $\underline{v}$  vektor koordináta-tengelyek irányába eső összetevői:  $v_1 \cdot \underline{i}$ ,  $v_2 \cdot \underline{j}$ ,  $v_3 \cdot \underline{k}$
- A  $\underline{v}$  vektor koordinátái:  $v_1, v_2, v_3$
- Megjegyzés: A  $\underline{v}$  helyvektor koordinátái azonosak végpontjának koordinátaival.



Jel.:  $\underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$

- A  $\underline{v}$  vektor hossza (a térbeli Pitagorasz-tétel alapján):

$$|\underline{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

# Műveletek vektorokkal: összeadás

Összeadás:



ha  $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  nem párhuzamos

# Összeadás (folyt.)

- Az összeadás tulajdonságai:

Legyenek  $\underline{a}$ ,  $\underline{b}$  és  $\underline{c}$  tetszőleges térbeli vektorok.

Ekkor:

$$(\underline{a} + \underline{b}) + \underline{c} = \underline{a} + (\underline{b} + \underline{c}) \quad (\text{asszociativitás})$$

$$\underline{a} + \underline{b} = \underline{b} + \underline{a} \quad (\text{kommutativitás})$$

$$\underline{a} + \underline{o} = \underline{a}$$

$$|\underline{a} + \underline{b}| \leq |\underline{a}| + |\underline{b}| \quad (\text{háromszög-egyenlőtlenség})$$

- Összeadás koordinátákkal:

Legyenek  $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$  és  $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$  térbeli vektorok. Ekkor:

$$\underline{a} + \underline{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

## ■ Skalárral való szorzás:

Legyen  $\underline{a}$  egy tetszőleges térbeli vektor,  $\lambda \in \mathbb{R}$  egy skalár. Ekkor:

$\lambda \cdot \underline{a}$  az a vektor, amelynek

- hossza:  $|\lambda| \cdot |\underline{a}|$ ,
- iránya:
  - azonos az  $\underline{a}$  vektor irányával, ha  $\lambda > 0$ ,
  - ellentétes az  $\underline{a}$  vektor irányával, ha  $\lambda < 0$ ,
  - tetszőleges, ha  $\lambda = 0$ .



## Skalárral való szorzás (folyt.)

- A skalárral való szorzás tulajdonságai:

Legyenek  $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  tetszőleges térbeli vektorok,

$\lambda, \mu \in R$  skalárok. Ekkor:

$$0 \cdot \underline{a} = \underline{o}$$

$$\lambda \cdot \underline{o} = \underline{o}$$

$$1 \cdot \underline{a} = \underline{a}$$

$$(\lambda + \mu) \cdot \underline{a} = \lambda \cdot \underline{a} + \mu \cdot \underline{a}$$

$$\lambda \cdot (\underline{a} + \underline{b}) = \lambda \cdot \underline{a} + \lambda \cdot \underline{b}$$

$$\lambda \cdot (\mu \cdot \underline{a}) = (\lambda \cdot \mu) \cdot \underline{a}$$

- Skalárral való szorzás koordinátákkal:


Legyen  $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$  egy tetszőleges térbeli vektor,  
 $\lambda \in R$  egy skalár. Ekkor:

$$\lambda \cdot \underline{a} = (\lambda \cdot a_1, \lambda \cdot a_2, \lambda \cdot a_3)$$

# Műveletek vektorokkal: különbség

- Különbség (származtatott művelet):

$$\underline{a} - \underline{b} = \underline{a} + (-1) \cdot \underline{b}$$



- A különbség számolása koordinátákkal:

Legyenek  $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$  és  $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$  térbeli vektorok. Ekkor:

$$\underline{a} - \underline{b} = (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$$

# Műveletek vektorokkal: skaláris szorzás

- Skaláris szorzás:

Legyenek  $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  tetszőleges térbeli vektorok.

Ekkor:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \varphi , \text{ ahol } \varphi \text{ a két vektor szöge.}$$

Megjegyzés: **a művelet eredménye skalár!**

## Skaláris szorzás (folyt.)

- A skaláris szorzás tulajdonságai:

Legyenek  $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  tetszőleges térbeli vektorok,  
 $\lambda \in \mathbb{R}$  skalár. Ekkor:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = \underline{b} \cdot \underline{a}$$

$$\underline{a} \cdot \underline{a} = |\underline{a}|^2 \quad \Rightarrow \quad |\underline{a}| = \sqrt{\underline{a} \cdot \underline{a}}$$

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underline{a} = \underline{o} \text{ vagy } \underline{b} = \underline{o} \text{ vagy } \varphi = 90^\circ$$

( azaz  $\underline{a} \perp \underline{b}$  )

$$\lambda \cdot (\underline{a} \cdot \underline{b}) = (\lambda \cdot \underline{a}) \cdot \underline{b} = \underline{a} \cdot (\lambda \cdot \underline{b})$$

$$\underline{a} \cdot (\underline{b} + \underline{c}) = \underline{a} \cdot \underline{b} + \underline{a} \cdot \underline{c}$$

## Skaláris szorzás (folyt.)

---

- Skaláris szorzás koordinátákkal:

Legyenek  $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$  és  $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$  térbeli vektorok. Ekkor:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

## Vektoriális szorzás:

( Ez a művelet síkbeli vektorokra nem értelmezhető! )


Legyenek  $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  tetszőleges térbeli vektorok. Ekkor  $\underline{a}$  és  $\underline{b}$  vektoriális szorzata (jel.:  $\underline{a} \times \underline{b}$ ) az a vektor,

- amelynek hossza:  $|\underline{a} \times \underline{b}| = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \sin\varphi$ , ahol  $\varphi$  a két vektor szöge,
- amely merőleges az  $\underline{a}$  vektorra és a  $\underline{b}$  vektorra is,
- amelyre az  $\underline{a}$ ,  $\underline{b}$  és  $\underline{a} \times \underline{b}$  vektorok **jobbrendszert** alkotnak.

(azaz  $\underline{a} \times \underline{b}$  oda mutat, ahonnan nézve az  $\underline{a}$ -t  $\underline{b}$ -be vivő,  $180^\circ$ -nál kisebb szögű forgatás pozitívnak látszik)

# Vektoriális szorzás (folyt.)

Az  $\underline{a}$ ,  $\underline{b}$  és  $\underline{a} \times \underline{b}$  vektorok térbeli elhelyezkedése:



# Vektoriális szorzás (folyt.)

## A vektoriális szorzás tulajdonságai:

$$\underline{a} \times \underline{b} \neq \underline{b} \times \underline{a}$$

$$\underline{a} \times \underline{b} = - (\underline{b} \times \underline{a})$$

$$(\underline{a} \times \underline{b}) \times \underline{c} \neq \underline{a} \times (\underline{b} \times \underline{c})$$

$$\lambda \cdot (\underline{a} \times \underline{b}) = (\lambda \cdot \underline{a}) \times \underline{b} = \underline{a} \times (\lambda \cdot \underline{b})$$

$$\underline{a} \times (\underline{b} + \underline{c}) = \underline{a} \times \underline{b} + \underline{a} \times \underline{c}$$

$$(\underline{b} + \underline{c}) \times \underline{a} = \underline{b} \times \underline{a} + \underline{c} \times \underline{a}$$

$$\underline{a} \times \underline{b} = \underline{o} \iff \underline{a} = \underline{o} \text{ vagy } \underline{b} = \underline{o} \text{ vagy } \varphi = 0^\circ \text{ vagy } \varphi = 180^\circ$$

(azaz  $\underline{a} \parallel \underline{b}$ )



## Vektoriális szorzás (folyt.)

---

### Vektoriális szorzás koordinátákkal:

Legyenek  $\underline{a} = (a_1, a_2, a_3)$  és  $\underline{b} = (b_1, b_2, b_3)$  térbeli vektorok. Ekkor:


$$\underline{a} \times \underline{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, -a_1b_3 + a_3b_1, a_1b_2 - a_2b_1)$$

# Az egyenes

Adott:  $P_0=(x_0, y_0, z_0)$  , az  $e$  egyenes egy pontja,

$\underline{v}=(v_1, v_2, v_3)$  , az  $e$  egyenes egy irányvektora.

Legyen  $P=(x, y, z)$  az  $e$  egyenes egy tetszőlegesen választott pontja. Jelölje  $\underline{r}_0$  a  $P_0$  pontba,  $\underline{r}$  a  $P$  pontba mutató helyvektort.



Ekkor  $\underline{r} = \underline{r}_0 + t \cdot \underline{v}$  teljesül valamely  $t \in \mathbb{R}$  valós paraméterre.

Megjegyzés: Térbeli egyeneseknél a normálvektor fogalmát nem használjuk.

## Az egyenes (folyt.)

Az egyenes paraméteres vektoregyenlete:

$$\underline{r} = \underline{r}_0 + t \cdot \underline{v} \quad , \quad t \in \mathbf{R}$$

Az egyenes paraméteres egyenletrendszere:

$$x = x_0 + t \cdot v_1$$

$$y = y_0 + t \cdot v_2$$

$$z = z_0 + t \cdot v_3 \quad , \quad t \in \mathbf{R}$$

**Megjegyzés:** A tér egy tetszőleges  $A=(x_a, y_a, z_a)$  pontja pontosan akkor van rajta egy  $e$  egyenesen, ha az  $A$  pont koordinátái kielégítik az  $e$  egyenes paraméteres egyenletrendszerét valamely  $t \in \mathbf{R}$  valós paraméterrel.

## Az egyenes (folyt.)

### Az egyenes paramétermentes egyenletrendszere

- Ha az irányvektor egyik koordinátája sem nulla:

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$

- Ha az irányvektor egyik koordinátája (pl.  $v_3$ ) nulla:

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2}, \quad z = z_0$$


- Ha az irányvektor két koordinátája is nulla, akkor **nem írható fel** paramétermentes egyenletrendszer.

# A sík

Adott:  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ , az  $S$  sík egy pontja,

$\underline{n} = (n_1, n_2, n_3)$ , az  $S$  sík egy normálvektora (a síkra merőleges, nullvektortól különböző vektor).

Legyen  $P = (x, y, z)$  az  $S$  sík egy tetszőlegesen választott pontja. Jelölje  $\underline{r}_0$  a  $P_0$  pontba,  $\underline{r}$  a  $P$  pontba mutató helyvektort.



Ekkor  $\underline{r} - \underline{r}_0 \perp \underline{n}$ , így  $\underline{n} \cdot (\underline{r} - \underline{r}_0) = 0$  azaz:

$$n_1 \cdot (x - x_0) + n_2 \cdot (y - y_0) + n_3 \cdot (z - z_0) = 0$$

# A sík egyenlete

A sík egyenlete:

$$n_1 \cdot (x-x_0) + n_2 \cdot (y-y_0) + n_3 \cdot (z-z_0) = 0$$

azaz:

$$n_1 \cdot x + n_2 \cdot y + n_3 \cdot z = n_1 \cdot x_0 + n_2 \cdot y_0 + n_3 \cdot z_0 = \text{konst.}$$

vagy:

$$A \cdot x + B \cdot y + C \cdot z = D,$$

ahol  $\underline{n} = (A, B, C)$  a sík egy normálvektora,  $D \in \mathbb{R}$  konstans.


## Térelemek kölcsönös helyzete:

### Két egyenes kölcsönös helyzete

#### Két térbeli egyenes ( $e$ és $f$ ) kölcsönös helyzete:

- A két egyenes azonos. ( $e \equiv f$ )  
Minden pont közös.
- A két egyenes párhuzamos. ( $e \parallel f$ )  
Nincs közös pont.
- A két egyenes metsző.  
Egy közös pont van.
- A két egyenes kitérő.  
Nincs közös pont.

# Két egyenes kölcsönös helyzetének vizsgálata





# Térelemek kölcsönös helyzete:

## Egyenes és sík kölcsönös helyzete

### Egyenes és sík ( $e$ és $S$ ) kölcsönös helyzete:

- Az egyenes a síkban helyezkedik el. ( $e \subset S$ )

Az egyenes minden pontja közös pont.


- Az egyenes és a sík párhuzamos. ( $e \parallel S$ )

Nincs közös pont.

- Az egyenes metszi a síkot.

Egy közös pont van.

# Egyenes és sík kölcsönös helyzetének vizsgálata



# Térelemek kölcsönös helyzete:

## Két sík kölcsönös helyzete

### Két sík ( $S_1$ és $S_2$ ) kölcsönös helyzete:

- A két sík azonos. ( $S_1 \equiv S_2$ )

Minden pont közös.


- A két sík párhuzamos. ( $S_1 \parallel S_2$ )

Nincs közös pont.

- A két sík metsző.

Végtelen sok közös pont van: a metszésvonal *egyenes*.

# Két sík kölcsönös helyzetének vizsgálata I.



# Két sík kölcsönös helyzetének vizsgálata II.

Két sík kölcsönös helyzetének vizsgálata a síkok egyenletei alapján:

Legyen a két sík ( $S_1$  és  $S_2$ ) egyenlete az alábbi:

$$S_1: \quad n_1 \cdot x + n_2 \cdot y + n_3 \cdot z = k_1$$

$$S_2: \quad n_1' \cdot x + n_2' \cdot y + n_3' \cdot z = k_2$$

1. Ha a két sík normálvektora nem párhuzamos, akkor  $S_1$  és  $S_2$  metsző.

2. Ha a két sík normálvektora párhuzamos, azaz  $\frac{n_1}{n_1'} = \frac{n_2}{n_2'} = \frac{n_3}{n_3'} = \lambda$ , akkor

- $S_1$  és  $S_2$  azonos ( $S_1 \equiv S_2$ ), ha  $\frac{k_1}{k_2} = \lambda$ ,
- $S_1$  és  $S_2$  párhuzamos ( $S_1 \parallel S_2$ ), ha  $\frac{k_1}{k_2} \neq \lambda$ .



# Térelemek metszéspontjának meghatározása

---

**Megjegyzés:** Két térelem metszéshalmaza nem más, mint egyenleteik rendszerének megoldáshalmaza.

**Vizsgáljuk:**

- Két egyenes metszéspontjának,
- Sík és egyenes metszéspontjának,
- Két sík metszésvonalának

**meghatározását.**

# Két egyenes metszéspontja

Legyen adott két egyenes ( $e$  és  $f$ ) paraméteres egyenletrendszere:

$$e: \quad x = x_0 + t \cdot v_1$$

$$y = y_0 + t \cdot v_2$$

$$z = z_0 + t \cdot v_3$$

$$f: \quad x = x_0' + t \cdot v_1'$$

$$y = y_0' + t \cdot v_2'$$

$$z = z_0' + t \cdot v_3'$$

**1.** Olyan  $t_1, t_2$  paraméterértékeket keresünk, amelyek a két egyenletrendszerben ugyanazon  $x, y, z$  koordinátaértékeket szolgáltatják:

$$x_0 + t_1 \cdot v_1 = x_0' + t_2 \cdot v_1'$$

$$y_0 + t_1 \cdot v_2 = y_0' + t_2 \cdot v_2' \quad \Rightarrow \quad t_1, t_2$$

$$z_0 + t_1 \cdot v_3 = z_0' + t_2 \cdot v_3'$$

**2.** A kapott paraméterértékeket az egyenletrendszerekbe visszahelyettesítve megkapjuk a metszéspont koordinátáit.

# Sík és egyenes metszéspontja

Legyen adott az  $S$  sík egyenlete és az  $e$  egyenes paraméteres egyenletrendszere:

$$S: n_1 \cdot x + n_2 \cdot y + n_3 \cdot z = k$$

$$e: x = x_0 + t \cdot v_1$$

$$y = y_0 + t \cdot v_2$$

$$z = z_0 + t \cdot v_3$$

- 1.** A sík egyenletébe  $x$ ,  $y$  és  $z$  helyére az egyenes paraméteres egyenletrendszeréből behelyettesítjük azok  $t$  paramétertől függő alakját és a kapott egyenletet megoldjuk  $t$ -re.
- 2.** A kapott  $t$  paraméterértéket az egyenes egyenletrendszerébe visszahelyettesítve megkapjuk a metszéspont koordinátáit.



# Két sík metszésvonala

Legyen adott két sík ( $S_1$  és  $S_2$ ) egyenlete:

$$S_1: \quad n_1 \cdot x + n_2 \cdot y + n_3 \cdot z = k_1$$

$$S_2: \quad n_1' \cdot x + n_2' \cdot y + n_3' \cdot z = k_2$$

1. Keresünk egy olyan  $P_0 = (x, y, z)$  pontot, amelynek koordinátái mindkét sík egyenletét kielégítik.

A három koordináta közül egy szabadon megválasztható!

2. A metszésvonal irányvektora:  $\underline{v} = \underline{n}_1 \times \underline{n}_2$ , ahol  $\underline{n}_1$  az  $S_1$  sík,  $\underline{n}_2$  az  $S_2$  sík normálvektora.

3. Felírjuk a  $P_0$  ponton átmenő,  $\underline{v}$  irányvektorú egyenes egyenletrendszerét.



# Térelemek távolságának meghatározása

---

Vizsgáljuk:

- két pont,
- pont és egyenes,
- két párhuzamos egyenes,
- két kitérő egyenes,
- pont és sík,
- sík és vele párhuzamos egyenes,
- két párhuzamos sík

távolságának meghatározását.

# 1. Két pont távolsága

---


Legyen  $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$  és  $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$  két tetszőleges pont.

Távolságuk (a térbeli Pitagorasz-tétel alapján):

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

## 2. Pont és egyenes távolsága

Legyen az  $e$  egyenes egy pontja  $P_0$  és egy irányvektora  $\underline{v}$ .  
Legyen  $P$  egy az  $e$  egyenesre nem illeszkedő pont. Ekkor:




$$t = \left| \underline{v} \times \overrightarrow{P_0P} \right| = |\underline{v}| \cdot d$$

$$d = \frac{\left| \underline{v} \times \overrightarrow{P_0P} \right|}{|\underline{v}|}$$

### 3. Két párhuzamos egyenes távolsága

Legyen  $e$  és  $f$  két párhuzamos egyenes.


- Felveszünk egy tetszőleges  $P$  pontot az  $f$  egyenesen.
- Kiszámítjuk a  $P$  pont és az  $e$  egyenes távolságát 2. szerint.



## 4. Két kitérő egyenes távolsága

Legyen  $e$  és  $f$  két kitérő egyenes. Kitérő egyenesek esetén mindig létezik két olyan egymással párhuzamos sík, amely az egyik ill. a másik egyenest tartalmazza. Azt az egyenest, amely  $e$ -t és  $f$ -t egyaránt merőlegesen metszi, **normáltranzverzális egyenesnek** nevezzük. Ezen egyenes  $e$  és  $f$  közé eső darabját **normáltranzverzálisnak** hívjuk.

$e$  és  $f$  távolsága: a normáltranzverzális hossza.



## 4. Két kitérő egyenes távolsága (folyt.)

Legyen  $P_1$  az  $e$ ,  $P_2$  az  $f$  egyenes tetszőleges pontja.

Legyen  $\underline{n}$  a normáltranzverzális irányába mutató tetszőleges vektor.

A keresett  $d$  távolság egyenlő a  $\overrightarrow{P_1P_2}$  vektor  $\underline{n}$  irányába eső merőleges vetületének hosszával.


A számolás lépései:

- Felveszünk egy-egy tetszőleges  $P_1$  és  $P_2$  pontot az  $e$  ill. az  $f$  egyeneseken.
- $\underline{n}$  számolása:  $\underline{n} = \underline{v}_e \times \underline{v}_f$  (vektoriális szorzat)
- $\underline{n}_e$  számolása:  $\underline{n}_e = \frac{1}{|\underline{n}|} \cdot \underline{n}$  (skalárral való szorzás)
- $d$  számolása:  $d = \left| \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \underline{n}_e \right|$  (skaláris szorzás)

## 5. Pont és sík távolsága

Legyen  $P$  az  $S$  síkra nem illeszkedő pont. Távolságuk meghatározása:

- Felírjuk annak az  $e$  egyenesnek a paraméteres egyenletrendszerét, amely átmegy  $P$ -n és merőleges  $S$ -re.
- Meghatározzuk az  $e$  egyenes és az  $S$  sík metszéspontját  $\Rightarrow M$
- A távolság:  $d = |\vec{PM}|$






## 6. Sík és vele párhuzamos egyenes távolsága

Legyen az  $f$  egyenes párhuzamos az  $S$  síkkal. Távolságuk meghatározása:


- Felveszünk egy tetszőleges  $P$  pontot az  $f$  egyenesen.
- Meghatározzuk a  $P$  pont és az  $S$  sík távolságát 5. szerint.



## 7. Két párhuzamos sík távolsága

Legyen az  $S_1$  és  $S_2$  sík párhuzamos. Távolságuk meghatározása:

- Felveszünk egy tetszőleges  $P$  pontot az  $S_2$  síkon.
- Meghatározzuk a  $P$  pont és az  $S_1$  sík távolságát 5. szerint.





# Térelemek szögének meghatározása

---

Vizsgáljuk:

- két egyenes,
- egyenes és sík,
- két sík

szögének meghatározását.

**Megjegyzés:** térelemek szöge mindig  $0^\circ$  és  $90^\circ$  közé esik.



# Két egyenes szöge

Legyen az  $e$  egyenes egy irányvektora  $\underline{v}_e$ , az  $f$  egyenes egy irányvektora  $\underline{v}_f$ . Az  $e$  és  $f$  szögének ( $\alpha$ ) meghatározása:

- Kiszámoljuk a két irányvektor szögét ( $\varphi$ ):

$$\cos \varphi = \frac{\underline{v}_e \cdot \underline{v}_f}{|\underline{v}_e| \cdot |\underline{v}_f|} \Rightarrow \varphi$$

- Ha  $\varphi \leq 90^\circ \Rightarrow \alpha = \varphi$   
Ha  $\varphi > 90^\circ \Rightarrow \alpha = 180^\circ - \varphi$





# Egyenes és sík szöge

Legyen az  $e$  egyenes egy irányvektora  $\underline{v}$ , az  $S$  sík egy normálvektora  $\underline{n}$ . Az  $e$  és  $S$  szögének ( $\alpha$ ) meghatározása:

- Kiszámoljuk az irányvektor és a normálvektor szögét ( $\varphi$ ):

$$\cos \varphi = \frac{\underline{v} \cdot \underline{n}}{|\underline{v}| \cdot |\underline{n}|} \Rightarrow \varphi$$

- Ha  $\varphi \leq 90^\circ \Rightarrow \alpha = 90^\circ - \varphi$   
Ha  $\varphi > 90^\circ \Rightarrow \alpha = \varphi - 90^\circ$



## Két sík szöge

Legyen az  $S_1$  sík egy normálvektora  $\underline{n}_1$ , az  $S_2$  sík egy normálvektora  $\underline{n}_2$ . Az  $S_1$  és  $S_2$  síkok szögének ( $\alpha$ ) meghatározása:

- Kiszámoljuk a két normálvektor szögét ( $\varphi$ ):

$$\cos \varphi = \frac{\underline{n}_1 \cdot \underline{n}_2}{|\underline{n}_1| \cdot |\underline{n}_2|} \quad \Rightarrow \quad \varphi$$

- Ha  $\varphi \leq 90^\circ \Rightarrow \alpha = \varphi$   
Ha  $\varphi > 90^\circ \Rightarrow \alpha = 180^\circ - \varphi$